

FICHA TÉCNICA DE PLAGUICIDA AGRÍCOLA

CAPTADOR®



Nombre comercial:	CAPTADOR®
Clase de uso:	Insecticida Agrícola (INS)
Ingrediente activo:	Spirodiclofen 250 g/l
Grupo químico:	Ácido tetrónico
Nombre químico (IUPAC):	[3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl] 2,2-dimethylbutanoate
Tipo de formulación:	Suspensión Concentrada (SC)
Categoría toxicológica:	III: Ligeramente Peligroso (Franja azul)
Modo de acción:	Insecticida selectivo, no sistémico, con acción de amplio espectro. Es eficaz sobre todos los estadios de desarrollo de los ácaros fitófagos, incluyendo acción sobre huevos y acción sobre la fecundidad en hembras reduciendo la producción de huevos.
Mecanismo de acción:	Insecticida inhibidor de la síntesis de ácidos grasos (lípidos) en los insectos, que actúa por ingestión sobre estadios juveniles y adultos de las plagas.
Presentaciones comerciales:	100 ml, 120 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 4 l, 10 l, 20 l
N° de Registro:	PQUA N°4363-SENASA
Formulador:	Jixi Agrosino Biotech Co. Ltd.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS l/ha	P.C. (días)	LMR (ppm)
Mandarina	Arañita roja de los cítricos (<i>Panonychus citri</i>)	0.6	14	0.1
Palto	Ácaro marrón (<i>Oligonychus punicae</i>)	0.4	1	0.01

LMR: Límite Máximo de Residuos

P.C.: Período de Carencia



Agripac Perú S.A.C.

FICHA TÉCNICA DE PLAGUICIDA AGRÍCOLA

CAPTADOR®

Modo de empleo:	Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación. CAPTADOR® puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse de que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.
Época y frecuencia de aplicación:	Se deberá evaluar la incidencia de la plaga y las condiciones óptimas de su desarrollo para proceder a la aplicación de CAPTADOR®. Se recomienda realizar un máximo de 1 aplicación por campaña.
Reingreso al área tratada:	24 horas.
Compatibilidad:	CAPTADOR® es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y abonos foliares utilizados convencionalmente en los cultivos recomendados. Antes de efectuar las mezclas, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con el plaguicida que se desea aplicar.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco).
- Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.
- Nunca transporte los plaguicidas junto con productos alimenticios.
- Después de la aplicación, lavar el equipo de aspersión interna y externamente en el campo y asperjar el líquido de enjuague en el cultivo.
- Lavar las boquillas de aspersión con agua a una presión más alta que la normal de aplicación.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Recolectar los envases y entregarlos al distribuidor para su disposición final.