

FICHA TÉCNICA DE PLAGUICIDA AGRÍCOLA

CHAMUCO

Agripac Perú S.A.C.

Nombre comercial:	CHAMUCO
Clase de uso:	Fungicida Agrícola (FUN)
Ingrediente activo:	Tebuconazole 250 g/l
Grupo químico:	TRIAZOLE
Nombre químico (IUPAC):	(RS)-p-clorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1 H, 1, 2,4-triazol-1-ylmethyl) pentan- 3-ol.
Tipo de formulación:	Emulsión, aceite en agua (EW)
Categoría toxicológica:	III: Ligeramente peligroso
Modo de acción:	Fungicida sistémico con acción protectora, curativa y erradicante.
Mecanismo de acción:	Interfiere en la síntesis de ergosterol en los hongos, mediante la inhibición de la desmetilación de los esteroides.
Presentaciones comerciales:	250 ml, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200 L
N° de Registro:	PQUA N° 3820-SENASA
Formulador:	SINOCHEM NINGBO LTD. / JIANGSU HIGH HOPE CORPORATION / NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL Co. Ltd

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L/200 L		
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0.5		14	0.50
	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>		0.2	21	0.02
	Cercosporiasis	<i>Cercospora asparagi</i>	0.55		n.a.	0.02
Páprika	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>		0.2	7	0.6
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>		0.1	14	0.5
	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>		0.2		
Alcachofa	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.4		7	0.6

LMR: Límite Máximo de Residuos

P.C.: Período de Carencia

Ppm: partes por millón

FICHA TÉCNICA DE PLAGUICIDA AGRÍCOLA

CHAMUCO



Agripac Perú S.A.C.

Modo de empleo:	Para la preparación verter la dosis a usar en un envase con agua limpia, de tal modo que se forme una suspensión uniforme. Llenar el tanque hasta la mitad con agua y poner los agitadores en marcha, luego agregar la suspensión uniforme de CHAMUCO preparada y finalmente completar el llenado del tanque con agua.
Época y frecuencia de aplicación:	El número máximo de aplicaciones debe ser de 2 aplicaciones /campaña /año. El intervalo entre aplicaciones debe ser de 9 a 15 días, dependiendo de la severidad de la enfermedad y siempre y cuando continúen las condiciones favorables para el desarrollo de ésta
Reingreso al área tratada:	12 horas.
Compatibilidad:	CHAMUCO es compatible con la mayoría de los plaguicidas, sin embargo es recomendable siempre antes de hacer una mezcla comprobar la compatibilidad física.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco).
- Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.
- Nunca transporte los plaguicidas junto con productos alimenticios.
- Después de la aplicación, lavar el equipo de aspersión interna y externamente en el campo y asperjar el líquido de enjuague en el cultivo.
- Lavar las boquillas de aspersión con agua a una presión más alta que la normal de aplicación.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de utilizar el contenido, inutilice la funda cortándola, colóquela en un contenedor y entréguela al distribuidor para su disposición final