FICHA TECNICA
Nombre del Producto: FARMOZINE
Versión: FT-FARMOZINE.V02
Fecha de creación: 14.09.2025
Ultima revisión: 31.10.2025

HERBICIDA

FARMOZINE


PQUA N° 3314-SENASA

I. GENERALIDADES DEL PRODUCTO

Ingrediente Activo	Atrazine
Formulación	Suspensión Concentrada - SC
Composición química	Atrazine 500 g/L
Toxicología	Ligeramente Peligroso
Titular	RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C.
Formulador	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.
Importador/Distribuidor	AGRIPAC PERÚ S.A.C.
Teléfono de contacto	(+511) 678-6084

II. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto	Suspensión acuosa
pH	5.5-8.5
Densidad	1.2 g/cm3
Grupo químico	Triazine
Formula estructural	



III. CUADRO DE USOS

Cultivo	PLAGAS		Dosis L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Maiz	Capulí cimarrón Chamico Lechera Pata de gallina Verdolaga	*Nicandra physalodes* *Datura stramonium* *Euphorbia peplus* *Eleusine indica* *Portulaca oleracea*	1.0-1.5	60	0.05

LMR: Límite Máximo de Residuos PC: Periodo de Carencia.

IV. CARACTERISTICAS DE USO DEL PRODUCTO

RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C.
Jr. Monterrey Nro. 355 Int.1003
Santiago de Surco, Lima - Perú
Teléfono: (511) 678-9544
Email: rainbowagro@rainbowagro.com

www.rainbowagro.com

Modo y mecanismo de acción	FARMOZINE es un herbicida sistémico y de contacto, tiene la característica de ser absorbido por las raíces y en menor proporción en hojas. Presenta translocación acropétala por el xilema, y se acumula en los tejidos fotosintéticos y puntos meristemáticos.
Frecuencia de aplicación	Realizar como máximo 01 (una) aplicación por campaña. Aplicar sobre las malezas jóvenes, hasta cuando el cultivo alcance entre 20 y 30 cm de altura.
Método de aplicación	Mezclar la dosis recomendada con un poco de agua en un recipiente hasta lograr una suspensión uniforme. Luego, vaciar el contenido en la mochila, cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la cantidad total requerida. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres. La absorción de FARMOZINE puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.
Periodo de reingreso	Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 12 horas.
Compatibilidad	FARMOZINE es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común a excepción de sustancias fuertemente oxidantes. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.
Fitotoxicidad	La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

V. INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Si la persona esta consciente, dar de beber abundante agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con aire fresco. Si la respiración se ha detenido, realizar respiración artificial.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua limpia durante por lo menos 15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Antídoto: No existe antídoto específico, tratamiento sintomático.

VI. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Este producto es tóxico si es ingerido.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Utilizar equipo de protección personal durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras horas después de la aplicación.

- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

VII. DISPOSICION DE ENVASES VACIOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.

