FICHA TÉCNICA DE PLAGUICIDA AGRÍCOLA

PROPILAQ® 250 EC

Agripac Perú S.A.C.

Nombre comercial:	PROPILAQ® 250 EC
Clase de uso:	Fungicida (FUN)
Ingrediente activo:	Propiconazole 250 g/l
Grupo químico:	Triazol
Nombre químico (IUPAC):	(±)-1-[2-(2,4-dichlorophenil)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]- 1H-1,2,4-triazole.
Tipo de formulación:	Concentrado emulsionable (EC)
Categoría toxicológica:	3: Moderadamente Peligroso
Modo de acción	Fungicida sistémico de amplio espectro con acción protectora, curativa y erradicante. Se absorbe por vía foliar con translocacción acropetal en el xilema.
Mecanismo de acción:	Propiconazole interrumpe la biosíntesis del ergosterol por inhibición de la demetilación (DMI), alterando la constitución de la membrana fúngica.
Presentaciones comerciales:	100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 200 l
N° de Registro SENASA:	PQUA N° 3686-SENASA
Titular del registro:	AGRIPAC PERÚ S.A.C
Formulador(es):	AGRIPAC S.A. / LIMIN CHEMICAL CO., LTD.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	PC	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico	L/ha	(días)	(ppm)
Vid	Oidium	(*Erysiphe necator)*	0.05	14	0.01

PC (Periodo de carencia)
L.M.R (Límite máximo de residuos)

Modo de empleo:	Para preparar la mezcla, llene el tanque de aspersión hasta la mitad con agua limpia, vierta la dosis recomendada de PROPILAQ® 250 EC y mezcle hasta obtener una solución estable, continúe adicionando agua hasta completar el volumen requerido. Se recomienda calibrar el equipo de aspersión antes de cada aplicación para conseguir una distribución uniforme.
Época y frecuencia de aplicación:	Realizar una (01) sola aplicación por campaña, considerando una campaña al año.
Fitotoxicidad:	No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

Av. Santo Toribio N° 115. Piso 5 INT 502A, San Isidro, Lima - Perú.
Teléfono: +51 1 6788155

PROPILAQ® 250 EC

Agripac Perú S.A.C.

Reingreso al área tratada:	48 horas después de la aplicación
Compatibilidad:	**PROPILAQ® 250 EC** es compatible con la mayoría de fungicidas, insecticidas y fertilizantes foliares a base de macro y micronutrientes. Es incompatible con productos a base de óxido de cobre y agentes oxidantes/alcalinos fuertes. Sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala, previo a la aplicación

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco).
- Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.
- Nunca transporte los plaguicidas junto con productos alimenticios.
- Después de la aplicación, lavar el equipo de aspersión interna y externamente en el campo y asperjar el líquido de enjuague en el cultivo.
- Lavar las boquillas de aspersión con agua a una presión más alta que la normal de aplicación.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Recolectar los envases y entregarlos al distribuidor para su disposición final.

Av. Santo Toribio N° 115. Piso 5 INT 502A, San Isidro, Lima - Perú.
Teléfono: +51 1 6788155