FICHA TÉCNICA DE PLAGUICIDA AGRÍCOLA

RODIMEX®

Agripac Perú S.A.C.

Nombre comercial:	RODIMEX®
Clase de uso:	Insecticida Agrícola (INS)
Ingrediente activo:	Lufenuron 50 g/l
Grupo químico:	Benzoylureas
Nombre químico (IUPAC):	N-[[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3 hexafluoropropoxy)phenyl]carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
Tipo de formulación:	Concentrado Emulsionable (EC)
Categoría toxicológica:	III: Ligeramente Peligroso (Franja azul)
Modo de acción:	Insecticida de acción sistémica y selectiva.
Mecanismo de acción:	El lufenuron es un inhibidor de la síntesis de quitina de acción en lepidópteros, lo cual resulta en la no formación de cutícula y exoesqueleto después de que el insecto muda de un instar al siguiente.
Presentaciones comerciales:	250 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l
N° de Registro:	PQUA N° 3968-SENASA
Formulador:	Sinochem Ningbo Ltd. / Jiangsu High Hope Corporation / Nanjing Essence Fine Chemical Co., Ltd.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
		l/ha	l/200l		
ESPÁRRAGO	Comedor de hoja (***Copitarsia corruda***)	0.2	-	7	0.02
	Gusano perforador (***Heliothis virescens***)	-	0.2 – 0.25		
	Gusano cogollero (***Spodoptera frugiperda***)	-	0.2		
PÁPRIKA	Gusano perforador (***Heliothis virescens***)	0.4	-	7	1.0
	Gusano de fruto (***Symmetrischema capsicum***)	-	0.2		
ARROZ	Gusano cogollero (***Spodoptera frugiperda***)	-	0.2 – 0.3	14	0.6
MAÍZ	Gusano cogollero (***Spodoptera frugiperda***)	-	0.2	35	0.01

LMR: Límite Máximo de Residuos
P.C.: Período de Carencia

Av. Santo Toribio N° 115. Piso 5 INT 502A, San Isidro, Lima - Perú.
Teléfono: +51 1 6786084

Modo de empleo:	Aplicar en pulverización con los equipos de uso común en buen estado de funcionamiento. Para la preparación de la mezcla, verter la dosis recomendada de RODIMEX® en un recipiente con agua, de tal modo que se forma una suspensión uniforme, luego agregar agua hasta completar el volumen requerido.
Época y frecuencia de aplicación:	El número máximo de aplicaciones debe ser de 2 aplicaciones/campaña en el cultivo de páprika (1 campaña/año) y 1 aplicación/campaña en espárrago (2 campañas/año). El momento de aplicación es cuando se empiece a registrar la presencia de la plaga (brotación) y/o cuando se empiece a observar los primeros síntomas de raspado de tallos.
Reingreso al área tratada:	24 horas.
Compatibilidad:	RODIMEX® es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco).
- Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.
- Nunca transporte los plaguicidas junto con productos alimenticios.
- Después de la aplicación, lavar el equipo de aspersión interna y externamente en el campo y asperjar el líquido de enjuague en el cultivo.
- Lavar las boquillas de aspersión con agua a una presión más alta que la normal de aplicación.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Recolectar los envases y entregarlos distribuidor para su disposición final.