FICHA TÉCNICA DE PLAGUICIDA AGRÍCOLA

TOPACIO®

Agripac Perú S.A.C.

Nombre comercial:	TOPACIO® 200
Clase de uso:	Insecticida (INS)
Ingrediente activo:	Alpha-cypermethrin 100 g/l
Grupo químico:	Piretroide
Nombre químico (IUPAC):	Mezcla racémica de: (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dymethylcyclopropanecarboxylate and (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dymethylcyclopropanecarboxylate
Tipo de formulación:	Concentrado emulsionable (EC)
Categoría toxicológica:	4: Ligeramente Peligroso
Modo de acción	Insecticida no sistémico con acción de contacto e ingestión.
Mecanismo de acción:	Insecticida neurótico de acción fulminante, paraliza el sistema nervioso del insecto ya que actúa sobre el axón, interfiriendo el paso de los átomos de sodio.
Presentaciones comerciales:	250 ml, 1litro, 200 litros
N° de Registro SENASA:	PQUA N° 3779-SENASA
Titular del registro:	AGRIPAC PERÚ S.A.C
Formulador(es):	Agripac S.A. / M/S, HERANBA INDUSTRIES LIMITED

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	PC	L.M.R.
	Nombre común	Nombre científico	L/ha	(días)	(ppm)
Maíz (*Zea mays*)	Gusano cogollero	(*Spodoptera frugiperda)*	0.15	30	0.05

PC (Periodo de carencia)
L.M.R (Límite máximo de residuos)

Modo de empleo:	Llenar el tanque de aplicación con agua hasta la mitad, agregar la cantidad indicada de TOPACIO, enjuagar el envase vacío tres veces agregando el agua de lavado al tanque de aplicación, completar con agua hasta su capacidad, manteniendo en agitación constante. No aplicar bajo condiciones que puedan afectar los resultados: polvo sobre las hojas, aguas lodosas con alto contenido de materia orgánica, exceso de rocío sobre las hojas.

Av. Santo Toribio N° 115. Piso 5 INT 502A, San Isidro, Lima - Perú.
Teléfono: +51 1 6788155

Época y frecuencia de aplicación:	Realizar una sola aplicación por campaña cuando se presenten los daños en el follaje a manera de raspaduras. Realizar una aplicación por campaña, considerando dos campañas al año.
Fitotoxicidad:	No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas
Reingreso al área tratada:	24 horas después de la aplicación
Compatibilidad:	Incompatible con productos alcalinos fuertes. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco).
- Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.
- Nunca transporte los plaguicidas junto con productos alimenticios.
- Después de la aplicación, lavar el equipo de aspersión interna y externamente en el campo y asperjar el líquido de enjuague en el cultivo.
- Lavar las boquillas de aspersión con agua a una presión más alta que la normal de aplicación.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Recolectar los envases y entregarlos al distribuidor para su disposición final.