FICHA TECNICA
Nombre del Producto: CLUDOCK
Versión: FT-INS-CLUDOCK.V01
Fecha de creación: 09.09.2024
Ultima revisión: 19.03.2026

INSECTICIDA

CLUDOCK


PQUA N° 3845-SENASA

I. GENERALIDADES DEL PRODUCTO

Ingrediente Activo	Clothianidin
Formulación	Gránulos Dispersables – WG
Composición química	Clothianidin 500 g/kg
Toxicología	Ligeramente Peligroso
Titular	**RAINBOW AGROSCIENCES S.A.C.**
Formulador	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd..
Importador/Distribuidor	**AGRIPAC PERÚ SAC**
Teléfono de contacto	+51 1 6788155

II. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto	Gránulos
Densidad	0.53 g/cm3 a 20 °C
Grupo químico	Neonicotinoide
Formula estructural	



III. CUADRO DE USOS

Cultivo	PLAGAS		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200L	Kg/ha		
Tomate	Mosquilla de los brotes	*Prodiplosis longifila*	-	0.4-0.5*	14	0.05
Arroz	Cigarrita del virus de la hoja blanca	*Tagosodes orizicolus*	0.15	-	7	0.5
Vid	Cochinilla harinosa	Planococcus citri	-	1.0	21	0.7
Arándano	Cochinilla harinosa	*Planococcus citri*	-	0.4-0.5	21	0.07

LMR: Límite Máximo de Residuos PC: Periodo de Carencia.
* Usar la menor dosis cuando se presente baja presencia de la plaga y la dosis más alta cuando se presenten mayores valores de infestación.

IV. CARACTERISTICAS DE USO DEL PRODUCTO

Modo y mecanismo de acción **CLUDOCK** es un insecticida sistémico del grupo Neonicotinoide, Actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos.

Frecuencia de aplicación Realizar dos aplicaciones de **CLUDOCK** por campaña. La primera aplicación se debe

	realizar entre los 30 y 40 días del trasplante, dependiendo de la variedad de tomate, población de la plaga y el clima reinante. La segunda aplicación se realizará a los diez días posteriores, en el cultivo de tomate. Para los otros cultivos aplicar el producto previa evaluación del campo, al observar la presencia de la plaga, realizar máximo dos aplicaciones por campaña.
Método de aplicación	Para garantizar uniformidad de la mezcla, coloque la cantidad de **CLUDOCK** a aplicar en un recipiente con agua hasta la mitad y agite suficientemente, complete luego el volumen de agua requerido mientras continúa agitando la mezcla mecánica, hidráulica o manualmente. Utilizar siempre equipos de aplicación calibrados correctamente y asegurarse que la aplicación se realice uniformemente. Antes de proceder a llenar los equipos es importante asegurarse de que estos estén bien limpios, sin residuos de otros plaguicidas y en buen estado para evitar posibles fugas de producto.
Periodo de reingreso	Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.
Compatibilidad	**CLUDOCK** es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.
Fitotoxicidad	**CLUDOCK** no causa fitotoxicidad si se sigue las recomendaciones mostradas en el cuadro de usos.

V. INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Acudir al centro hospitalario inmediatamente y mostrar la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua limpia, durante por lo menos 15 minutos, con los párpados abiertos durante el lavado.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón, incluyendo el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito, no dar de beber nada a un paciente que se
- encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Controle la respiración y si fuera necesario brindar respiración artificial.
- Este producto no tiene antídoto específico.
- El tratamiento es sintomático y de soporte.

VI. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

VII. DISPOSICION DE ENVASES VACIOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.