FICHA TÉCNICA DE PLAGUICIDA AGRÍCOLA

GLIFOLAQ® 36 SL

Agripac Perú S.A.C.

Nombre comercial:	GLIFOLAQ® 36 SL
Clase de uso:	Herbicida (HER)
Ingrediente activo:	Sal Isopropilamina de Glifosato 480 g/l
Grupo químico:	Derivado de glicina
Nombre químico (IUPAC):	N-(phosphonomethyl) glycine.
Tipo de formulación:	Concentrado Soluble (SL)
Categoría toxicológica:	III: Ligeramente Peligro
Modo de acción	Herbicida sistémico no selectivo con acción post-emergente.
Mecanismo de acción:	Glifosato inhibe la síntesis de aminoácidos aromáticos que se producen por la vía biosintética del shikimato, provocando clorosis y necrosis de los cultivos más jóvenes.
Presentaciones comerciales:	1 l, 4 l, 5 l, 20 l, 200 l, 1 gal, 5 gal
N° de Registro SENASA:	PQUA N° 501-SENASA
Titular del registro:	AGRIPAC PERÚ S.A.C
Formulador(es):	Agripac S.A. / Hangzhou Kaiyi Chemical Co., Ltd. / Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS l/200 l	PC (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Caña de azúcar	Rabo de zorro Coquito Gramalote Pajilla	*Setania verticillata* *Cyperu rotundus* *Panicum pupurascens* *Leptochloa filiformis*	2.0 – 3.0	NA	2.0
Arroz	Moco de pavo Botoncito	*Echinochloa crusgalli* *Eclipta alba*			0.1
Mandarina	Grama dulce Grama china Lechera Verdolaga Rabo de zorro Chamico Cadillo Pata de gallina Amor seco Capulí cimarrón	*Cydodon dactylon* *Sorghum halapense* *Euphorbia spp* *Portulaca oleracea* *Setania verticillata* *Datura stramonium* *Cenchrus echinatus* *Eleusine indica* *Bidens pilosa* *Nicandra physaloides*			0.5
Vid	Yuyo Verdolaga Amor seco Capulí cimarrón	*Amaranthus dubius* *Portulaca oleracea* *Bidens pilosa* *Nicandra physaloides*			0.5

Espárrago	Coquito Grama china Rabo de zorro Cadillo Pata de gallina	*Cyperus rotundus* *Sorghum halapense* *Setaria verticilata* *Cenchrus echinatus* *Eleusine indica*			0.1

PC (Periodo de carencia)
L.M.R (Límite máximo de residuos)

Modo de empleo:	Agite bien en envase antes de usar el producto. Evite que la aspersión moje las paredes del cultivo. Se emplea diluyendo en agua empleándose la proporción indicado en el cuadro de uso. Glifolaq® 36 SL es un herbicida post-emergente de acción sistémico no selectivo para el control de malezas anuales y perennes. No guardar la mezcla preparada para usarlo en días posteriores. Calibrar el equipo de aspersión antes de la aplicación para conseguir una distribución uniforme de la mezcla.
Época y frecuencia de aplicación:	La frecuencia depende del cultivo y del manejo de riego. Se aplica en plena época de mayor actividad fisiológica de las malezas.
Fitotoxicidad:	No se observa fitotoxicidad sobre los cultivos tratados cuando se aplican las medidas agronómicas adecuadas.
Reingreso al área tratada:	24 horas después de la aplicación
Compatibilidad:	Es incompatible con herbicidas residuales como ureas sustituidas, triazinas u otros herbicidas tipo hormonal, como bipiridilos, fenoxis, organoársenicos, etc.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco).
- Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.
- Nunca transporte los plaguicidas junto con productos alimenticios.
- Después de la aplicación, lavar el equipo de aspersión interna y externamente en el campo y asperjar el líquido de enjuague en el cultivo.
- Lavar las boquillas de aspersión con agua a una presión más alta que la normal de aplicación.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Recolectar los envases y entregarlos al distribuidor para su disposición final.