FICHA TÉCNICA DE PLAGUICIDA AGRÍCOLA

PROPIL

Agripac Perú S.A.C.

Nombre comercial:	PROPIL
Clase de uso:	Fungicida Agrícola (FUN)
Ingrediente activo:	Propineb 700 g/kg Cymoxanil 60 g/kg
Grupo químico:	Propineb: Ditiocarbamato Cymoxanil: Acetamida
Nombre químico (IUPAC):	Propineb: Polymeric zinc propylenebis (dithiocarbamate) Cymoxanil: 1-[(EZ)-2-cyano-2-methoxyiminoacetyl]-3-ethylurea
Tipo de formulación:	Polvo Mojable (WP)
Categoría toxicológica:	III: Ligeramente peligroso
Modo de acción:	Propineb: Fungicida con acción protectante, antiesporulante y curativa. Cymoxanil: Fungicida sistémico con acción protectora y curativa.
Mecanismo de acción:	PROPIL es un fungicida que combina la acción del propineb con el cymoxanil, por lo cual se logra la inhibición de la respiración celular del patógeno, la inhibición de la síntesis de ADN, ARN y aminoácidos, así como la alteración del metabolismo celular fúngico lo que conlleva a su muerte.
Presentaciones comerciales:	0.5 kg, 1 kg, 25 kg
N° de Registro:	PQUA N° 3513-SENASA
Formulador:	JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
		kg/cil 200 L	kg/ha		
Papa	Hielo fungoso, rancha o seca seca (***Phytophthora infestans***)	0.5	1.0	14	0.1

LMR: Límite Máximo de Residuos
P.C.: Período de Carencia
PPM: partes por millónm

Av. Santo Toribio N° 115. Piso 5 INT 502A, San Isidro, Lima - Perú.
Teléfono: +51 1 6788155

Modo de empleo:	PROPIL se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla, distribuyendo la cantidad necesaria de en un balde, luego vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua requerida. Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, atomizadora, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.
Época y frecuencia de aplicación:	Se recomienda utilizar el producto cuando se presentan condiciones favorables para el desarrollo del patógeno. Estas condiciones dependerán del historial de campo. Aplicar sólo una vez por campaña, considerando como máximo 2 campañas por año. En caso de que se requiera otra aplicación, rotar con otros productos de diferente modo de acción. Como máximo aplicar 1kg / ha
Reingreso al área tratada:	24 horas.
Compatibilidad:	PROPIL es compatible con otros plaguicidas de uso común excepto con aquellos de marcada reacción alcalina. En caso de duda, hacer pruebas previas de compatibilidad.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco).
- Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.
- Nunca transporte los plaguicidas junto con productos alimenticios.
- Después de la aplicación, lavar el equipo de aspersión interna y externamente en el campo y asperjar el líquido de enjuague en el cultivo.
- Lavar las boquillas de aspersión con agua a una presión más alta que la normal de aplicación.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de utilizar el contenido, inutilice la funda cortándola, colóquela en un contenedor y entréguela al distribuidor para su disposición final