FICHA TÉCNICA DE PLAGUICIDA AGRÍCOLA

PYRACON

Agripac Perú S.A.C.

Nombre comercial:	**PYRACON**
Clase de uso:	Fungicida Agrícola (FUN)
Ingrediente activo:	Boscalid 252 g/kg Pyraclostrobin 128 g/kg
Grupo químico:	Boscalid: Carboxamida; Pyraclostrobin: Estrobilurina
Nombre químico (IUPAC):	Boscalid: 2-chloro-N-[2-(4-chlorophenyl)phenyl]pyridine-3-carboxamide. Pyraclostrobin: methyl {2-[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl} (methoxy)carbamate.
Tipo de formulación:	Gránulos Dispersables (WG)
Categoría toxicológica:	4: Ligeramente peligroso
Modo de acción:	Boscalid: Fungicida sistémico y translaminar, con acción preventiva y curativa. Pyraclostrobin: Fungicida preventivo, curativo y traslaminar de amplio espectro.
Mecanismo de acción:	**PYRACON** es un fungicida sistémico y translaminar con acción preventiva, curativa y erradicante. Actúa bloqueando la respiración mitocondrial fúngica en diferentes sitios de acción, provocando la muerte del patógeno por inhibición en la producción de energía. Actúa sobre las diferentes etapas de desarrollo del hongo.
Presentaciones comerciales:	100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 25 kg
N° de Registro:	PQUA N° 3587-SENASA
Formulador:	NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO. LTD.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS kg/200 L	P.C. (días)	LMR (ppm)
Vid	Oidium (*Erysiphe necator*)	0.12 – 0.16	14	5.0* 2.0**

(*) Boscalid
(**) Pyraclostrobin
ppm: partes por millón

LMR: Límite Máximo de Residuos
P.C.: Período de Carencia

Av. Santo Toribio N° 115. Piso 5 INT 502A, San Isidro, Lima - Perú.
Teléfono: +51 1 6786084

Modo de empleo:	Diluir la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Usar agua limpia. Las plantas deben mojarse por completo sin llegar al escurrimiento, previa calibración de los equipos de aplicación.
Época y frecuencia de aplicación:	Realizar como máximo 1 aplicación por campaña al año, en etapa de desarrollo vegetativo, previa evaluación de la plaga y cuando las condiciones climáticas sean favorables para su desarrollo. En caso de persistir la plaga, usar otro producto con mecanismo de acción diferente.
Reingreso al área tratada:	12 horas.
Compatibilidad:	**PYRACON** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco).
- Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.
- Nunca transporte los plaguicidas junto con productos alimenticios.
- Después de la aplicación, lavar el equipo de aspersión interna y externamente en el campo y asperjar el líquido de enjuague en el cultivo.
- Lavar las boquillas de aspersión con agua a una presión más alta que la normal de aplicación.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de utilizar el contenido, inutilice la funda cortándola, colóquela en un contenedor y entréguela al distribuidor para su disposición final