Protekting Phytosanitary, S.L, Sant Gabriel 50, 08950 Esplugues de Llobregat – Spain t+34 932 011 750 f+34 932 011 751 www.protekting.com

SPINOPROTEKT 480 SC

(Spinosad 480 SC)

INSECTICIDA AGRÍCOLA

1. IDENTIFICACIÓN

Número de registro: PQUA Nº 3980 - SENASA

Nombre Común: Spinosad
Formulación: Suspensión concentrada (SC)
Concentración: Spinosad 480g/L
Grupo químico: Spinosinas

Presentaciones: 1L, 5L, 20L, 100mL, 250mL, 500mL, 200L

2. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

Apariencia: Líquido
Color: Blanco marfil
Olor: Inodoro
Estabilidad: El producto es estable bajo condiciones normales de almacenamiento, con una vida útil de no menos de 2 años.
Densidad relativa: 1.0914g/mL (20ºC)
pH: 7.8

3. TOXICOLOGÍA

Categoría Toxicológica **4 – LIGERAMENTE PELIGROSO**

4. MODO DE ACCIÓN

SPINOPROTEKT 480 SC es un insecticida que tiene actividad de contacto e ingestión.

5. MECANISMO DE ACCIÓN

Tiene como ingrediente activo a Spinosad, el cual actúa en el sistema nervioso, provoca excitación activando los receptores de acetilcolina en los nervios, lo que provoca la despolarización y ocasiona que los insectos sufran contracciones musculares involuntarias, temblores y falta de coordinación. Los insectos afectados no se recuperan. La excitación extrema conduce a la parálisis por fatiga muscular, postración y finalmente ocurre la muerte del insecto.

6. RECOMENDACIONES DE USO

SPINOPROTEKT 480 SC se aplica en forma de aspersión foliar, para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado. Se aplica con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado (pulverizador manual o accionado por el tractor) y debidamente calibrado, que asegure una adecuada cobertura sobre el cultivo.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200 L	L/ha		
Palto	Thrips	*Thrips tabaci*	0.03	0.15	7	0.02
Vid	Thrips	*Thrips tabaci*	0.03	0.15	14	0.5

PC = Periodo de carencia **L.M.R. =** Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Realizar una aplicación por campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO:
No ingresar al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

7. COMPATIBILIDAD

SPINOPROTEKT 480 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas, a excepción de agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes. Sin embargo, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa

Ultima actualización: 04 de febrero de 2025

Protekting Phytosanitary, S.L, Sant Gabriel 50, 08950 Esplugues de Llobregat – Spain t+34 932 011 750 f+34 932 011 751 www.protekting.com