FICHA TÉCNICA DE PLAGUICIDA AGRÍCOLA

SUREKILL®

Agripac Perú S.A.C.

Nombre comercial:	SUREKILL®
Clase de uso:	Fungicida Agrícola (FUN)
Ingrediente activo:	Prochloraz 450 g/l
Grupo químico:	Imidazole
Nombre químico (IUPAC):	N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide
Tipo de formulación:	Concentrado emulsionable (EC)
Categoría toxicológica:	III: Ligeramente Peligroso (Franja azul)
Modo de acción:	Fungicida con acción sistémica y de contacto, preventiva y curativa.
Mecanismo de acción:	Inhibe la formación de la membrana celular del hongo por inhibición de la síntesis del ergosterol.
Presentaciones comerciales:	100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 4 l, 10 l, 20 l, 200 l
N° de Registro:	PQUA N° 4364-SENASA
Formulador:	Jixi Agrosino Biotech Co. Ltd.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS %	P.C. (días)	LMR (ppm)
Palto	Muerte regresiva ***(Lasiodiplodia theobromae)***	0.1	14	7

LMR: Límite Máximo de Residuos
P.C.: Período de Carencia

Av. Santo Toribio N° 115. Piso 5 INT 502A, San Isidro, Lima - Perú.
Teléfono: +51 1 6788155

Modo de empleo:	Aplicar con equipo de aspersión terrestre previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad del volumen al agua a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen del agua de aplicación. Calibrar el equipo previamente. Aplicar en cultivos debidamente hidratados con suelo en capacidad de campo. Usar preferentemente agua con pH de 6.0 – 6.5.
Época y frecuencia de aplicación:	PALTO: Aplicar previa evaluación de la plaga y de las condiciones óptimas de su desarrollo. Realizar como máximo 1 aplicación por campaña/año a una dosis máxima de 0.86 l/ha. De persistir la plaga, usar otro fungicida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia.
Reingreso al área tratada:	12 horas.
Compatibilidad:	Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y álcalis. Antes de efectuar las mezclas, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con el plaguicida que se desea aplicar.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

- Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco).
- Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.
- Nunca transporte los plaguicidas junto con productos alimenticios.
- Después de la aplicación, lavar el equipo de aspersión interna y externamente en el campo y asperjar el líquido de enjuague en el cultivo.
- Lavar las boquillas de aspersión con agua a una presión más alta que la normal de aplicación.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Recolectar los envases y entregarlos al distribuidor para su disposición final.