

ZinX 18%

Fertilizante Foliar Para Corregir Deficiencias de Zinc

DESCRIPCIÓN

ZIN-X 18%™ es un fertilizante recomendado para corregir deficiencias de Zinc en cultivos diversos, y ha sido disenado para aplicación foliar o al suelo.

El elemento Zinc es muy importante en para promover el desarrollo hormonal, la formación de semilas y granos,influencia la síntesis de proteínas, la tasa de maduración de semillas y tallos, altura y largo de plantas.

ZIN-X 18%™ es altamente efectivo para usarse en condiciones adversas de suelos tales como altos niveles de fosfatos,ph alcalino, alta salinidad, altos niveles de carbonatos y suelos arcillosos (que absorben nutrientes).

BENEFICIOS

- El Zinc (Zn) es uno de los ocho micronutrientes esenciales.
- Contribuye a resistir bajas temperaturas
- Ayuda a la síntesis de carbohidratos durante la fotosíntesis.
- Participa en la transformación de los azúcares en almidón.
- Interviene en el metabolismo de hormonas al regular el nivel de auxinas por medio de la síntesis del aminoácido triptófano.
- Actúa en los procesos de maduración y producción de semillas.
- Favorece la formación, polinización, viabilidad del polen y fertilidad del polen.
- Ayuda al mantenimiento e integridad de las membranas celulares.
- Brinda tolerancia a las plantas ante patógenos, especialmente los del suelo y ayuda a refrozar los sistemas de defensa de las células en contra de los radicales libres altamente tóxicos.
- Influencia en la elongación de los brotes y la expansión de las hojas.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingredientes Activos:	**%P/Vol**
Gluconato de Zinc	18.0%
Inertes	82.0%

ExcelAg, Corp. USA

Producción Rica, Sana y Sostenible

ExcelAg.com

MADE IN USA



ZINX 18%

Fertilizante Foliar Para Corregir Deficiencias de Zinc

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS(Lit./Ha)
ARÁNDANOS	ZIN-X 18% debe aplicarse en los periodos de emergencia temprana y antes de la polinización. RECOMENDACIONES DE USO PRE-FLORACION: APLICACION AL SUELO: aplicarse con programa de fungicidas antes de la floración a dosis de 1 lit/200L de agua APLICACION FOLIAR: aplicarse con programa de fungicidas antes de la floración a dosis de 0.3-0.5 lit/200L de agua POST-FLORACION: FOLIAR: Aplicar a dosis de 0.3 -0.5 lit/200 L de agua AL SUELO: Aplicar a dosis de 1 – 2 lit/200 L de agua	1.0 - 1.50
VID		1.0 - 1.50
LIMONES, MANGOS		1.0 - 1.50
PALTOS		1.0 - 1.50
MANDARINAS		1.0 - 1.50
ARROZ, MAÍZ		1.0 - 1.50
HORTALIZAS		1.0 - 1.50

DISPONIBLE EN

1 lit -5 lit- 20 lit- 200 lit- 1000 lit



ExcelAg.com

ExcelAg, Corp. USA

Para más información sobre este producto, visite ExcelAg.com, llame al (305) 670-0145, o envíenos un correo electrónico a info@excelag.com

MADE IN USA